


WAT TE DOEN BIJ KOLIEK?

Koliek is een probleem in het spijsverteringsstelsel van paarden dat dodelijk kan zijn


OORZAKEN KOLIEK

- Overmatige inname van suikers
- Overmaat aan stro, hooi, vlas, ...
- Plotse verandering van voedingsschema
- Inname van zand tijdens het eten
- Uitdroging
- Chronische stress
- Worminfecties



SYMPTOMEN KOLIEK

- Verminderde eetlust of helemaal niet eten
- Rusteloosheid: veel liggen en weer opstaan
- Kijken naar de flank
- Naar de buik schoppen
- Zwiepen met de staart
- Schrapen met de voorbenen
- Uitrekken met neiging tot schijnbaar urineren
- Lusteloosheid
- Zweten en koortsig
- Verhoogde hartslag en ademhaling



WAT TE DOEN BIJ ACUTE KOLIEK?

- Bel de dierenarts en beschrijf de symptomen
- Indien mogelijk het paard laten stappen
- Bij heftige koliek het paard in een paddock zetten waar het zichzelf niet kan beschadigen
- Controleer de mestballen (diarree of erg droog) en de hoeveelheid
- Laat het paard niet eten en geef het geen grote hoeveelheid water!

#VLPfridayfact